Спектроскопия ЯМР супрамолекулярных систем

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер.

Магнитные моменты ядер

Магнитным моментом обладает ядро с полуцелым спином, состоящее из нечетного суммарного числа протонов и нейтронов. Например, ядра ${}^1\text{H}$, ${}^{13}\text{C}$ (спин $I = 1/2$). Кроме того, есть немагнитные ядра ($I = 0$) и квадрупольные ($I > 1/2$).

Расщепление энергетических уровней ядер со спином $I = 1/2$ в постоянном магнитном поле.

Характеристики некоторых ядер

Ядро	Спин	Природное содержание (%)	Магнитный момент (в μ_B)	Частота ЯМР (МГц) (в поле 2.4 Т)	Относительная чувствительность(при природном содержании)
^1H	1/2	99.98	2.7927	100	1.00
^2H	1	0.02	0.8574	15.35	$1.44 \cdot 10^{-6}$
^{13}C	1/2	1.1	0.7021	25.14	$1.76 \cdot 10^{-4}$
^{14}N	1	99.64	0.4036	7.22	$1.00 \cdot 10^{-3}$
^{15}N	1/2	0.36	-0.2834	10.13	$3.65 \cdot 10^{-6}$
^{17}O	5/2	0.04	-1.8930	13.56	$1.07 \cdot 10^{-5}$
^{19}F	1/2	100	2.6273	94.07	0.833
^{29}Si	1/2	4.7	-0.5548	19.86	$3.68 \cdot 10^{-3}$
^{31}P	1/2	100	1.1305	40.48	$6.63 \cdot 10^{-2}$

**ЯМР спектрометр
“Bruker DRX-500”**

Блок-схема спектрометра ядерного магнитного резонанса.

Облучение радиочастотным импульсом длительности t .

При этом возбуждается частота ν_0 и все частоты в диапазоне от $\nu_0 - 1/t$ до $\nu_0 + 1/t$

Принцип неопределенности:
при частоте $\nu_0 = 500$ МГц и длине импульса $t = 1$ мкс мы получаем диапазон частот 500 ± 1 МГц

Все переходы в диапазоне от $n_0 - 1/t$ до $n_0 + 1/t$ генерируют сигналы ЯМР –
затухающие синусоидальные колебания

Регистрация сигнала и преобразование Фурье

Химические сдвиги

Химические сдвиги

$$H' = -s H_0$$

где s — константа экранирования

Химические сдвиги

Нуль – точка отсчета – сигнал тетраметилсилана (ТМС)

$$d_H = (n_H - n_{\text{ТМС}}) \cdot 10^6 / n_0 - \text{миллионные доли}$$

DMSO-d₆ – 2.50 м.д.

CDCl₃ – 7.27 м.д.

CD₃CN – 1.96 м.д.

←
Слабое поле

→
Сильное поле

Химические сдвиги

Химический сдвиг приблизительно отражает суммарную электронную плотность около данного атома водорода. Рост электроотрицательности ближайших фрагментов – смещение в слабые поля, т.е. в область меньших констант экранирования

Наиболее характерная область появления сигналов ядер ^1H для различных классов соединений

Спектры ЯМР ^1H

Фрагмент спектра ЯМР ^1H α -ЦД в D_2O .

Спектры ЯМР ^{13}C

Фрагмент спектра ЯМР ^{13}C α -ЦД в D_2O .

Магнитная анизотропия

Дополнительный вклад в экранирование, вносимый отдельными функциональными группами.

Магнитная анизотропия бензольного кольца, этиленовой, карбонильной и ацетиленовой групп.

Область внутри конуса соответствует дополнительному экранированию ($\Delta\delta_H < 0$) – смещению хим. сдвигов в сильные поля.

Магнитная анизотропия

Спектры ЯМР ^1H (ароматическая область) аналога виологена (a), стильбена (b) и их смесей 2 : 1 (c), 1 : 1 (d) и 1 : 6 (e) в MeCN-d_3 .

Магнитная анизотропия

Фрагменты спектров ЯМР ^1H дибетаина (а), СВ[7] (б) и их смеси 1:1 (в) в $\text{D}_2\text{O}-\text{MeCN}-d_3$ (10:1).

Константы спин-спинового взаимодействия

Химически неэквивалентные ядра в молекулах испытывают также воздействие взаимных внутренних магнитных полей, передающихся от ядра к ядру через электроны химических связей.

Диаграмма энергетических уровней для двухспиновой системы АВ: (a) – без спин-спинового взаимодействия; (b) – при наличии спин-спинового взаимодействия. Показаны только линии ядра А.

J - КССВ

Константы спин-спинового взаимодействия

Спектр 1%-ного раствора этилбензола в четыреххлористом углероде.

Рис. I-8. Теоретический спектр системы пяти спинов A_3B_2 .

Константы спин-спинового взаимодействия

Вид сигнала	Число линий ($n + 1$)	Распределение интенсивностей
Синглет	1	1
Дублет	2	1 : 1
Триплет	3	1 : 2 : 1
Квартет (квадруп- лет)	4	1 : 3 : 3 : 1
Квинтет	5	1 : 4 : 6 : 4 : 1
Секстет	6	1 : 5 : 10 : 10 : 5 : 1
Септет	7	1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1

Константы спин-спинового взаимодействия

Константы спин-спинового взаимодействия

Структура молекулы	Константа связи, гц	Структура молекулы	Константа связи, гц
12—15		4—10
2—9		0,5—2,0
0		10—13
0—3,5		1—3
6—14		2—3
11—18	орто	7—10
		мета	2—3
		пара	до 1

Кривая Карплуса — Конроя, описывающая зависимость вицинальной константы спин-спинового взаимодействия $^3J_{\text{HH}}$ от двугранного угла ϕ .
 Сплошная линия — теоретическая кривая; заштрихованная площадь — область экспериментальных значений.

Конформационный обмен

Спектр ЯМР ^1H циклогексана- d_{11} при различных температурах

Закрепление конформации

ЯМР-титрование

Изменения в спектрах ЯМР ¹H при титровании α-ЦД и *p*-иодфенолята натрия в D₂O. Сигнал H5 смещается в слабое поле, сигнал H3 - в сильное поле.

ЯМР-титрование

ЯМР-титрование

Двумерный (2D) ЯМР

- COSY (COrrelation SpectroscopY) – корреляционная ^1H – ^1H спектроскопия, позволяющая оценить магнитные взаимодействия между протонами через электроны разделяющих их химических связей.
- HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation) – корреляционная ^1H – ^{13}C спектроскопия, позволяющая оценить магнитные взаимодействия между углеродными атомами и непосредственно связанными с ними протонами, т.е. для связей C–H.
- HMBC (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation) – корреляционная ^1H – ^{13}C спектроскопия, позволяющая оценить дальние взаимодействия между углеродными атомами протонами (как правило, через 2 или 3 связи); взаимодействия через одну связь в ходе 2D эксперимента подавляются.
- NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) – спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера между ядрами ^1H , сближенными в пространстве на расстояние до 3.5 Е, но не обязательно соединенными цепочкой ковалентных связей.
- ROESY (Rotating Overhauser Effect SpectroscopY) – вариация спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера.

COSY (Correlation Spectroscopy)

Спектр COSY α -ЦД в D_2O .

HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation)

Спектр HSQC α -ЦД в D_2O .

NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy)

NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY)

β -CD

КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС

Фрагмент спектра ROESY смеси нафтилпиридина ($C = 1.6 \cdot 10^{-3}$ моль/л) и β -ЦД ($C_{\beta\text{-ЦД}} = 6 \cdot 10^{-3}$ моль/л) в $D_2O\text{-}MeCN\text{-}d_3$ (4:1).

ROESY (Rotating Overhauser Effect SpectroscopY)

Диффузионно-упорядоченная спектроскопия ЯМР
(**DOSY** - **D**iffusion-**O**rdere**D** **S**pectroscop**Y**)

Эксперимент DOSY

Эксперимент DOSY

Эксперимент DOSY

Эксперимент DOSY

Эксперимент DOSY

Эксперимент DOSY комплексообразование

Эксперимент DOSY комплексообразование

Эксперимент DOSY комплексообразование

DOSY (Diffusion-OrdereD SpectroscopY)

β -ЦД

Холевая кислота (Guest)

Зависимость значений коэффициентов диффузии холевой кислоты и β -ЦД от соотношения их концентраций в D₂O.